

亿奥邦（北京）生物科技研究有限公司 ELISA检测生物送样要求

样本类型及样本要求

样本类型	样本要求
细胞培养上清	离心去除沉淀，收集上清。样品量120μl/孔，建议提供500μl以上足量样本，样本应避免反复冻融。
血清	血液室温静置，自然凝固10-20min后，2500rpm 离心20min，收集上清。建议提供500μl以上足量样本，样本应避免溶血，避免反复冻融。
血浆	推荐提供血浆，一般不加抗凝剂，收集全血后立即离心，若必须使用抗凝剂，建议使用EDTA，避免使用肝素钠、柠檬酸溶液。收集血浆后，建议分装保存，-70℃保存。建议提供500μl以上足量样本，样本应避免溶血，避免反复冻融。
组织匀浆	建议液氮研磨，加入蛋白酶抑制剂。建议提供500μl以上足量样本，样本应避免反复冻融。
细胞匀浆	建议加入蛋白酶抑制剂。建议提供500μl以上足量样本，样本应避免反复冻融。
运输	干冰或冰袋寄送。
ELISA检测试剂盒	依据说明书要求寄送，严禁反复冻融。

样本包装运输注意事项 **重要信息，注意阅读。**

样本寄出前，请联系亿奥邦相关技术人员或给 18503867156@163.com 邮箱发送一份填写完整的电子版《亿奥邦 ELISA 检测生物样本信息表》；如有特殊情况，请在快递发出前与亿奥邦细胞增殖检测技术服务人员电话联系，比如客户自送样本、提前寄送样本、有其它物品随样本一起快递需要额外点收等，以便安排人手，防止丢失。

请将填写完整的纸质版《亿奥邦 ELISA 检测生物样本信息表》以及其它技术资料(如有)密封于塑料袋内，随样本一起寄出；合同请另单快递给对应接收人员，不要与样本一起快递，既避免物流分拣环节导致合同遗失，也避免干冰或蓝冰冷凝水可能损坏文件。

样本置于 1.5ml 或其它型号的低吸附离心管里；管上清楚标明样本名称，样本管上的名称要与亿奥邦 ELISA 检测生物样本信息表一致，请双人核实无误；用 parafilm 膜把样本管缠紧密封好；将样本管置于保护用的 50ml 离心管或其它容器里，用适量纸、纱布或棉花塞紧，防止样本管晃动，旋紧盖子。

根据样本类型选择室温、蓝冰或者干冰包装，选择最快的运输方式以免样本降解；合理安排发货时间，避免周六、周日或法定节假日到达，以免样本丢失。低温运输采用安全的干冰，不要用危险的液氮；液氮如果渗进样本管，在温度发生变化时因体积膨胀有可能导致爆炸，毁坏样本。

项目结束后，剩余样本免费保存 1 个月；如果需要延长保存期或者返还，请提前与亿奥邦 ELISA 检测技术服务人员联系。

